



古丁晚造插秧接近尾声

高州市古丁镇各村群众重视粮食生产,抢抓农时做好晚造插秧工作。连日来,各村群众克服高温天气等困难,插秧工作如火如荼地进行。目前,大部分村

的插秧工作已接近尾声,为晚造粮食生产奠定了基础。

茂名晚报记者 张海锋 通讯员 黄诒高 摄

天天好彩

公益福彩
善行天下

中国福利彩票
CHINA WELFARE LOTTERY

福彩宗旨 扶老 助残 救孤 济困

茂名市福利彩票发行中心

玩法	期号	最新开奖结果	玩法	期号	最新开奖结果
双色球	2025088期	01 03 13 18 21 25 06	3D	2025205期	9 2 0
快乐8	2025205期	43 05 28 61 13 73 01 33 44 78 27 53 09 50 29 70 19 30 31 17			

医疗机构 基孔肯雅热防控指南

- 1.什么是基孔肯雅热?**
由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,通过伊蚊叮咬传播,症状以发热、关节剧痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语,意为“弯曲之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。
- 2.如何传播:**主要通过媒介伊蚊叮咬传播。
- 3.流行地区:**在全球热带和亚热带地区广泛流行。
- 4.流行季节:**主要流行于夏季和秋季。
- 5.易感人群:**各年龄人群普遍易感。
- 6.潜伏期、传染期:**
潜伏期一般为1-12天,多为3-7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

- 7.典型症状:**
主要表现为发热、关节剧痛和皮疹。
- (1) 发热:通常以发热最先出现,持续1-7天;
- (2) 关节疼痛:发热后出现关节疼痛等症,疼痛多出现在腕关节、膝关节、踝关节、指关节等小关节;
- (3) 皮疹:2-3天后会出现皮疹,多为斑丘疹,皮疹可出现在四肢或全身,一般3-5天就退疹。
- 整个病程通常持续5-7天,绝大多数患者病情较轻,少数人群可能出现并发症,如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等,严重时可能危及生命。

防控措施

1.强培训,早发现

- 加强基孔肯雅热诊疗培训,一线临床医生增强意识,及早发现病例;

- 加强宣传,医务人员、就诊病人与陪护人员做好个人防护。

2.常清洁,去积水

- 每天及时清理各种散在垃圾容器,如垃圾袋、一次性饭盒、水杯等;
- 室外的各种盆、瓶、罐等容器积水需要及时倾倒,清除废弃的容器;
- 院内或室内的水桶、水缸、水槽等储水容器严密加盖并定期换水;
- 清除室内尤其是传染病房的积水,如花盆托盘、饮水机水槽、空调冷却水、冰箱底部的水盘、水生植物等,应每隔3-5天清除或换水;

- 洼地、假山、树洞内积水,可用砂土填埋;
- 及时疏通沟渠,填补建筑凹陷,避免积水;
- 水池、沙井、电缆沟、排水沟等难以清除积水的水体,可投放灭蚊幼虫剂。

3.灭成蚊,防叮咬

- 绿化带和楼梯走廊放置灭蚊灯进行物理灭蚊;
- 病房和办公室可在门窗安装防蚊纱网,配备蚊香、电蚊拍、家用卫生杀虫气雾剂等驱蚊灭蚊,基孔肯雅热收治病区可放置灭蚊灯、病房准备蚊帐;

- 尽量避免在蚊虫出没频繁的时段(上午7-9点、下午4-6点)在树荫、草丛等户外阴暗潮湿处长时间逗留;
- 必要时,请专业公司定期对外环境进行灭蚊,包括孳生地清理和对绿化带植被被、墙角、楼梯间、杂物间、楼道等场所进行灭蚊。

广东省疾病预防控制中心
广东省卫生健康宣传教育中心

@健康广东

建筑工地 基孔肯雅热防控指南

- 1.什么是基孔肯雅热?**
由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,通过伊蚊叮咬传播,症状以发热、关节剧痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语,意为“弯曲之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。
- 2.如何传播:**主要通过媒介伊蚊叮咬传播。
- 3.流行地区:**在全球热带和亚热带地区广泛流行。
- 4.流行季节:**主要流行于夏季和秋季。
- 5.易感人群:**各年龄人群普遍易感。
- 6.潜伏期、传染期:**
潜伏期一般为1-12天,多为3-7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

- 7.典型症状:**
主要表现为发热、关节剧痛和皮疹。
- (1) 发热:通常以发热最先出现,持续1-7天;
- (2) 关节疼痛:发热后出现关节疼痛等症,疼痛多出现在腕关节、膝关节、踝关节、指关节等小关节;
- (3) 皮疹:2-3天后会出现皮疹,多为斑丘疹,皮疹可出现在四肢或全身,一般3-5天就退疹。
- 整个病程通常持续5-7天,绝大多数患者病情较轻,少数人群可能出现并发症,如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等,严重时可能危及生命。

防控措施

1.清积水,防孳生

- 每天及时清运垃圾,如垃圾袋、一次性饭盒、水杯等,清除卫生死角;
- 对建筑构件材料、搅拌机、手推车、水桶、塑料薄膜、篷布等,至少每周清理一次积水,对容器加盖或反扣;
- 对建筑工地的蓄水池、排水沟、沙井、打桩洞、地下室等难以清除积水的水体,可每周至少一次用水泵抽水排空,也可投放少量废弃机油,或者投放灭蚊幼虫剂。对沟渠实行硬化,保持流水畅通。

- 清除工棚、办公室内积水,如花盆托盘、饮水机水槽、空调冷却水、冰箱底部的水盘、水生植物等,应每隔3-5天清除或换水。

2.灭成蚊,防叮咬

- 定期请专业公司对工地的外环境,办公室、宿舍、食堂、厕所等进行灭蚊;
- 厕所、工棚、食堂等可放置小型灭蚊灯进行物理灭蚊;
- 每间工棚备有蚊虫驱避剂和蚊香或家用卫生杀虫气雾剂,并悬挂蚊帐;

- 必要时,请专业公司定期灭蚊,包括孳生地清理和对工地的外环境、杂物间、办公室、宿舍、食堂、厕所等场所进行灭蚊;
- 通过多种方式开展防蚊宣传,提高工友防蚊意识。

3.广宣传,早就诊

- 多种方式开展防蚊宣传,提高工友防蚊意识;

- 如工友出现发热等不适,应及时就医;
- 如工地出现基孔肯雅热病例,主动配合属地居委开展相关处置工作。

广东省疾病预防控制中心
广东省卫生健康宣传教育中心

@健康广东