

信宜启动“百千万工程”主题文学采风创作系列活动

茂名晚报讯 记者李光耀 通讯员 高干 陆东青 作家采风写信宜,文学赋能“百千万”。近日,由信宜市作家协会牵头策划、贵子镇人民政府和信宜市文学艺术界联合会主办、信宜市文化馆和信宜市作家协会具体承办、信宜市融媒体中心协办的“神韵山水、绿美信宜”——信宜市“百千万工程”主题系列采风创作活动,在有“茂名北大门”之称的贵子镇举行启动仪式。

启动仪式上,贵子镇领导介绍了贵子镇的基本情况,贵子镇推进“百千万工程”的具体做法和成效,典型镇村培育、特色产业发展、风貌提升、创新机制等方面情况,让与会作家对贵子镇有了更深入的了解。

会后,信宜市作家协会会员代表一行20人在贵子镇有关干部的带领下,深入贵子镇开展采风活动。在贵子镇农副产品加工基地,作家们在基地人员的讲解下,了解贵子麒麟苦瓜的种植、销售情况、苦瓜加工基地的生产流程以及苦瓜产品介绍。作家们参观贵子苦瓜产品展示专柜,看到一只小小的麒麟苦瓜能加工出苦瓜面、苦瓜片、苦瓜茶等产品,纷纷赞叹。

下午,作家们来到龙雨茶场参观。雨后的贵子空气清新,山野翠绿,云雾缥缈。作家们沿着宽阔的山道一路步行到半山腰,沿途花香袭人,一株株茶树在梯地上整齐地排列,茶叶在雨珠的滋润下青翠欲滴。当看到清冽的山泉水流进茶厂老板精心修筑的锦鲤池,举目所见是绵延的山,绿树茂密、云雾缭绕,作家们纷纷赞叹贵子的绿色生态环境。

随后,作家们来到秋风根村坚果种植基地。在将军山的半山腰,作家们看到漫山遍野的果树已经挂满一颗颗饱满圆润的坚果,看到了产业振兴的希望。作家们的目光还被高耸入云的将军山吸引。作家们纷纷走上石林拍照,站在半山腰的山石上俯瞰山下村庄,但见绿树密布,云雾缥缈,山间梯田层次分明,再次感叹贵子镇自然条件得天独厚,绿色生态资源丰富,历史人文底蕴深厚,发展前景广阔。



采风活动现场。

最后,作家们来到位于中和村的环北部湾广东水资源配置工程贵子项目点,认真聆听工作人员介绍工程概况和工程建设进度,现场感受这项惠及粤西1000多万人口的国家重点水利工程的宏大。在现场,作家们还遇到了茂名市优秀共产党员中和村干部刘名芳,大家纷纷靠近她与她合影,认为她的事迹感动人心,是很好的创作素材。

“百千万工程”主题文学采风走进贵子镇的采风

创作活动,让作家作者们了解了贵子镇的特色产业、一二三产业以及农文旅融合发展情况,领略了贵子镇独特的自然山水风光和凤土人情,激发了作家作者们的创作灵感,积累了丰富的文学创作素材,也为作家作者们的文学创作输入源源不断的创作动力。

该活动,揭开了“神韵山水、绿美信宜”——信宜市“百千万工程”主题文学采风创作系列活动的序幕,为以后的文学赋能“百千万工程”采风创作活动打下坚实基础。

居民小区、村镇 基孔肯雅热防控指南



1.什么是基孔肯雅热?

由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,通过伊蚊叮咬传播,症状以发热、关节痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语,意为“弯脊之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。

2.如何传播:

主要通过媒介伊蚊叮咬传播。

3.流行地区:

在全球热带和亚热带地区广泛流行。

4.流行季节:

主要流行于夏季和秋季。

5.易感人群:

各年龄人群普遍易感。

6.潜伏期、传染期:

潜伏期一般为1~12天,多为3~7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

7.典型症状:

主要表现为发热、关节剧痛和皮疹。

(1) 发热: 通常以发热最先出现,持续1~7天;

(2) 关节疼痛: 发热后出现关节疼痛等症,疼痛多出现在腕关节、膝关节、踝关节、指关节等小关节;

(3) 皮疹: 2~3天后会出现皮疹,多为斑丘疹,皮疹可出现在四肢或全身,一般3~5天就退疹。

整个病程通常持续5~7天,绝大多数患者病情较轻,少数人群可能出现并发症,如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等,严重时可能危及生命。

防控措施

1.常清洁,去积水

- 及时清理生活垃圾,如垃圾袋、一次性饭盒、水杯等;
- 室外的各种盆、瓶、罐等容器积水需要及时倾倒,清除废弃的容器;
- 庭院内或室内的水桶、水缸、水槽等储水容器严密加盖并定期换水;
- 洼地、假山、树洞积水,可用砂土填埋;
- 景观水池饲养观赏鱼,适用鱼种有金鱼、锦鲤、白条鱼、罗非鱼等;
- 清除室内积水,尤其是水生植物、花盆托盘、饮水机水槽,空调冷却水,冰箱底部的水盒等,应每隔3~5天清除或换水;
- 及时疏通沟渠,填补建筑凹陷,避免积水;
- 水池、沙井、电缆沟、排水沟、积水沟等难以清除积水的水体,可投放灭蚊幼虫剂。

2.灭成蚊,防叮咬

- 绿化带和楼梯走廊放置灭蚊灯进行物理灭蚊;
- 住户可在门窗安装防蚊纱网,休息时使用蚊帐,使用蚊香、电蚊拍、家用卫生杀虫气雾剂等驱蚊灭蚊;
- 尽量避免在蚊虫出没频繁的时段(上午7~9点、下午4~6点)在树荫、草丛等户外阴暗潮湿处长时间逗留;
- 必要时,请专业公司定期对外环境进行灭蚊,包括孳生地清理和对绿化带植被、墙角、楼梯间、杂物间、楼道等场所进行灭蚊。

3.广宣传,早就诊

- 做好宣传,提醒居民如出现发热等症状,应及时就医;
- 如小区或周边出现基孔肯雅热病例,主动配合属地居委、物业开展相关处置工作。

居家篇 基孔肯雅热防控指南



1.什么是基孔肯雅热?

由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,通过伊蚊叮咬传播,症状以发热、关节痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语,意为“弯脊之痛”,形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。

2.如何传播:

主要通过媒介伊蚊叮咬传播。

3.流行地区:

在全球热带和亚热带地区广泛流行。

4.流行季节:

主要流行于夏季和秋季。

5.易感人群:

各年龄人群普遍易感。

6.潜伏期、传染期:

潜伏期一般为1~12天,多为3~7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

7.典型症状:

主要表现为发热、关节痛和皮疹。

(1) 发热: 通常以发热最先出现,持续1~7天;

(2) 关节疼痛: 发热后出现关节疼痛等症,疼痛多出现在腕关节、膝关节、踝关节、指关节等小关节;

(3) 皮疹: 2~3天后会出现皮疹,多为斑丘疹,皮疹可出现在四肢或全身,一般3~5天就退疹。

整个病程通常持续5~7天,绝大多数患者病情较轻,少数人群可能出现并发症,如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等,严重时可能危及生命。

防控措施

1.防蚊灭蚊

(1) 家庭应安装蚊帐、纱门、纱窗等;适时使用蚊香、电子驱蚊器、电蚊拍、灭蚊灯等装备,可使用家用卫生杀虫气雾剂对房间实施灭蚊处理。

(2) 基孔肯雅热流行区或流行季节,外出活动或旅行时,如去公园、绿化带等地点,应穿长袖衣服及长裤,并于外露的皮肤及衣服上涂上蚊虫驱避药物。避免在树荫、草丛、凉亭等户外蚊虫较多的地方逗留过久。

2.清除居家积水

(1) 清除或倒置室外各种闲置的可积水容器,如放在户外、阳台、天台等的花盆、缸罐、轮胎、可积水的垃圾等。

(2) 种养的水生植物应每隔3~5天换水洗瓶、清洗根须。

(3) 保持花盆托盘不积水。

(4) 及时清除各种无用积水,如沟渠、天台等地面积水、填塞竹节和树洞。

3.及时就医

人被感染基孔肯雅病毒的“花斑蚊”叮咬后,一般经过1~12天的潜伏期,突然发病。出现症状时应及时就医,早发现、早治疗,以免延误病情或者通过蚊子传染给家人,并积极配合疾控部门相关处置工作。