

多国谴责+民众抗议！

以军“接管加沙城”计划内外承压

新华社北京8月10日电 23个阿拉伯和伊斯兰国家9日联合发声，谴责以色列企图全面军事控制加沙地带的计划“公然违反国际法”。同时，数以万计以色列民众当晚走上特拉维夫街头，抗议并要求以军迅速结束战争。

23国：以军“公然违反国际法、不可接受”

巴林、埃及、印度尼西亚、约旦等23个阿拉伯和伊斯兰国家以及阿拉伯国家联盟和伊斯兰合作组织9日发表联合声明，共同谴责和反对以色列企图对加沙地带实施全面军事控制。

声明指出，以色列的计划“危险且不可接受”，“公然违反国际法，并企图以武力巩固非法占领、制造既成事实”。

声明还说，以色列的行动路线延续了“严重的违法行为”，包括杀戮和饥饿政策、强迫巴勒斯坦人流离失所和吞并巴勒斯坦土地等。以方这些做法“抹杀了一切和平机会，破坏地区和国际社会缓和局势及和平解决冲突的努力，加剧了对巴勒斯坦人的大规模侵害”。

声明要求以色列无条件允许人道援助进入加沙，保障救援机构的行动自由。

声明还表示支持埃及、卡塔尔等国家为推动释放被扣押人员所作努力，呼吁尽快落实加沙重建计划，并敦促各方积极参与即将在埃及首都开罗举行的加沙重建会议。

声明重申“坚决反对任何将巴勒斯坦人迁出其土地的企图”，强调“只有通过实施‘两国方案’，才能实现公正、持久的和平”。

以色列总理办公室8日说，以安全内阁已批准总理内塔尼亚胡关于“击败哈马斯”的计划，以军准备接管加沙地带北部的加沙城。

超10万民众抗议：要停火！

数以万计以色列民众9日晚在位于特拉维夫的以国防军总部前举行大规模游行集会，抗议以军接管加沙地带北部加沙城计划，要求迅速结束在加沙地带的战争。

一个代表大多数被扣押人员家属的团体当晚发表声明说，超过10万人参加了游行集会。新华社记者在现场看到，集会人群打出“反对种族灭绝”“结束可怕的战争”“要和平，反战争”“反对加沙的饥饿政策”“反对全面占领加沙”“让他们立刻回家”等标语。抗议人群手持火炬，围绕以军总部所在街区游行，呼喊口号，要求迅速在加沙地带停火，与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)达成停火换人协议，让所有被扣押人员获释。

据《以色列时报》报道，被扣押人员马坦的母亲埃纳芙·赞高克在集会上说，以安全内阁的决定得不到公众支持，“大多数人都希望结束战争，让所有人回家”。

《耶路撒冷邮报》援引一名以军预备役军官母亲的话报道，接管加沙城计划势必将以色列推向一场“永无休止的战争”。她在集会上呼吁以军士兵不要进入加沙地带执行该计划，“拒绝参与一场明显非法的战争”。

埃土重申：反对以军重新占领加沙

埃及总统塞西9日在开罗会见到访



8月9日，以色列民众手持被扣押人员的海报在特拉维夫参加游行集会。
新华社发(贾马尔·阿瓦德摄)

的土耳其外长费丹，双方重申反对以色列“重新军事占领加沙地带”。

埃及总统府当天在一份声明中说，埃土两国呼吁立即实现加沙停火、让人道主义援助进入加沙并推动冲突双方交换被扣押人员。双方还重申反对让巴勒斯坦人流离失所的方案。

以色列曾长期占领加沙地带。1967

年第三次中东战争期间，以色列占领约旦河西岸、东耶路撒冷和加沙地带，随后开始兴建犹太人定居点。2005年，以色列军队和定居点人员撤出加沙地带。2007年，哈马斯夺取加沙地带实际控制权，以方开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资出入。

(记者:董修竹、陈君清、路一凡)

口岸、机场

基孔肯雅热防控指南

1.什么是基孔肯雅热?

由基孔肯雅病毒引起的急性传染病，通过伊蚊叮咬传播，症状以发热、关节剧痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语，意为“弯曲之痛”，形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。

2.如何传播:

主要通过媒介伊蚊叮咬传播。

3.流行地区:

在全球热带和亚热带地区广泛流行。

4.流行季节:

主要流行于夏季和秋季。

5.易感人群:

各年龄人群普遍易感。

6.潜伏期、传染期:

潜伏期一般为1-12天，多为3-7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

7.典型症状:

主要表现为发热、关节剧痛和皮疹。

(1) 发热: 通常以发热最先出现，持续1-7天;

(2) 关节疼痛: 发热后出现关节疼痛等症，疼痛多出现在腕关节、肘关节、踝关节、指关节等小关节;

(3) 皮疹: 2-3天后会出现皮疹，多为斑丘疹，皮疹可出现在四肢或全身，一般3-5天就退疹。

整个病程通常持续5-7天，绝大多数患者病情较轻，少数人群可能出现并发症，如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等，严重时可能危及生命。

防控措施

1.旅客出行“三注意”

(1)注意提前准备

●留意目的地国家相关健康风险提示，提高警惕，做好个人防护;

●准备宽松、浅色长衣长裤，含避蚊胺、避蚊酯成分的驱蚊剂;

(2)注意防蚊叮咬

●尽量穿着浅色长衣长裤，身体裸露部位涂驱蚊剂，并及时按说明补涂;

2.归国来华“三留意”

(1)入境时要留意:

若出现发热等不适立即向海关申报。

(2)入境后要留意:

14天内出现发热等症状，立即就医并告知旅居史。

(3)生活环境要留意:

及时清除居家积水和蚊虫，保护家人健康。

3.口岸设施别大意

●及时清理环境中各类积水，定期开展灭蚊等除“四害”工作;

●外出旅游时，防蚊须在前;症状轻或重，都要去就医!

广东省疾病预防控制中心

广东省卫生健康宣传教育中心

@健康广东

旅游景点、酒店宾馆

基孔肯雅热防控指南

1.什么是基孔肯雅热?

由基孔肯雅病毒引起的急性传染病，通过伊蚊叮咬传播，症状以发热、关节剧痛和皮疹为特征。名称源自非洲土语，意为“弯曲之痛”，形容患者因关节剧痛弯腰蜷缩的姿态。

2.如何传播:

主要通过媒介伊蚊叮咬传播。

3.流行地区:

在全球热带和亚热带地区广泛流行。

4.流行季节:

主要流行于夏季和秋季。

5.易感人群:

各年龄人群普遍易感。

6.潜伏期、传染期:

潜伏期一般为1-12天，多为3-7天。传染期大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。

7.典型症状:

主要表现为发热、关节剧痛和皮疹。

(1) 发热: 通常以发热最先出现，持续1-7天;

(2) 关节疼痛: 发热后出现关节疼痛等症，疼痛多出现在腕关节、肘关节、踝关节、指关节等小关节;

(3) 皮疹: 2-3天后会出现皮疹，多为斑丘疹，皮疹可出现在四肢或全身，一般3-5天就退疹。

整个病程通常持续5-7天，绝大多数患者病情较轻，少数人群可能出现并发症，如长期关节疼痛(持续数月甚至数年)、心肌炎、脑炎等，严重时可能危及生命。

防控措施

1.孳生地管理

●倡导文明出行，垃圾入桶不落地;

●每天及时清运垃圾，及时清理各种散在容器，如一次性饭盒、水杯、矿泉水瓶等，尤其是在绿化带、灌木丛等地;

●及时清理范围内小型容器积水，如水桶、缸罐、花盆托等，将闲置的容器加盖反扣;

●景观水池、喷泉可饲养金鱼、锦鲤、白条鱼、罗非鱼等鱼类灭蚊;

●清除室内容器积水，如花盆托盘，饮水机水箱，冰箱托盘，各种厨具和餐具、水生植物等，应每隔3-5天清除或换水;

●花园假山、树洞、竹筒等积水，可用砂土填埋。

2.防蚊灭蚊

●绿化带和餐厅内可放置灭蚊灯进行物理灭蚊;

●保安室、休息区等可加装防蚊纱网，配合灭蚊灯或蚊香驱蚊灭蚊，给保安、门童等配备驱蚊剂或者蚊香;

●酒店客房内可安装纱窗，配备蚊香或家用卫生杀虫气雾剂、驱避剂等，必要时安装蚊帐;

●必要时，请专业公司定期对外环境进行灭蚊，包括孳生地清理和对绿化带植被、墙角、楼梯间、杂物间、楼道等场所进行灭蚊。

3.健康宣传

●定期对工作人员进行培训，提高防蚊意识，如出现发热等症状，及时就医;

●通过液晶显示屏、海报、温馨提示等方式开展宣传，提醒旅客注意防蚊。

广东省疾病预防控制中心

广东省卫生健康宣传教育中心

@健康广东